





RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 PUC-SP / ACSC PROVA 10/12/2018

PROVA: ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO EM **CLÍNICA MÉDICA**

GABARITO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Gabarito republicado em 04/01/2019, em função dos recursos deferidos.

1 B 2 A 3 A 4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	CLÍNICA MÉDICA	
3 A 4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	1	В
4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	2	Α
5 C 6 C 7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	3	Α
6 C 7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	4	В
7 C 8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	5	
8 D 9 A 10 D 11 C 12 D	6	С
9 A 10 D 11 C 12 D	7	С
10 D 11 C 12 D	8	D
11 C 12 D	9	Α
12 D	10	D
	11	С
	12	D
13 D	13	D
14 A*	14	A *
15 D	15	D
16 B	16	В
17 B	17	В

CLÍNICA MÉDICA	
18	В
19	С
20	Α
21	Α
22	D
23	С
24	В
25	В
26	Α
27	D
28	Α
29	Α
30	D
31	С
32	D
33	Α
34	D
35	С

LEGENDA:

GABARITO DA QUESTÃO DISSERTATIVA

A) Doença de base: Lúpus Eritematoso Sistêmico em atividade.

^{* =} gabarito alterado.





Núcleo de Vestibulares e Concursos

Critérios laboratoriais – FAN, Coombs Direto + Complemento diminuído, Leucopenia Critérios clínicos: febre a esclarecer, poliartralgia, complicações hematológicas e renais. Ao exame físico icterícia, múltiplas ulcerações orais.

- B) Complicações observadas:
 - Comprometimento hematológico: Anemia hemolítica auto imune, Leucopenia com linfocipenia, aumento de bilirrubinas indiretas e icterícia; Coombs positivo.
 - Comprometimento renal: nefrite lúpica/insuficiência renal hematúria dismórfica e proteinúria de 24 horas de 4,20g e creatinina 3,2mcg/dl.
 - Comprometimento articular: poliartralgia
 - Comprometimento cutâneo/mucoso: úlceras orais
 - Comprometimento geral: febre, astenia.
- C) Terapêutica de início imediato após o resultado destes exames: pulsoterapia com metilprednisolona. Considerar imunossupressão a seguir (outro imunossupressor? ciclofosfamida). Considerar outra opção terapêutica como Rituximabe posteriormente.
- **D)** Derrame pericárdico, derrame pleural. Miocardite?
- **E)** Terapêutica dialítica, punção/drenagem do derrame pleural e possível drenagem do derrame pericárdico, mudar imunossupressor ou associar Rituximabe.