

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA PUC-SP • 2024



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

Instruções

- A duração da prova é de 2 horas e meia, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora e meia.
- A prova contém 40 questões objetivas, cada uma com quatro respostas, das quais apenas uma é correta, sobre temas da área de pré-requisito.
- Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar e rasurar.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou em branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para este fim.
- Não é permitido o uso de relógio, seja digital, seja analógico, com calculadoras ou outros recursos. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha ótica de respostas.

Boa prova!

• Questão 01 •

A lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, criando a Conferência Nacional de Saúde e o Conselho de Saúde. É correto afirmar:

- a) O CONASS e o CONASEMS têm representantes no Conselho Nacional de Saúde.
- b) Cabe ao Conselho Nacional de Saúde reunir-se a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para formulação de políticas públicas.
- c) A Conferência Nacional de Saúde tem a competência de deliberar e é composta pelos representantes de cada nível governamental.
- d) A representação dos usuários do sistema de saúde é composta pela metade do conjunto dos representantes.

• Questão 02 •

O trabalho em equipe na estratégia Saúde da Família é concebido como:

- a) Fracionamento de um mesmo processo de trabalho originário do qual outros trabalhos parcelares derivam.
- b) Articulação das ações e interação dos agentes consoante à proposta da integralidade das ações em saúde.
- c) Recurso para aumento da produtividade e da racionalização dos serviços.
- d) Articulação consoante à proposta da integralidade das ações em saúde e a necessidade atual de racionalização dos serviços.

• Questão 03 •

A taxa de mortalidade infantil é menor nos países desenvolvidos – Finlândia, Islândia, Japão, Noruega e Suécia (3 mortes a cada mil nascidos). As piores médias são dos países pobres, especialmente das nações africanas e asiáticas. O Afeganistão apresenta a incrível média de 154 óbitos por mil nascidos vivos. (<https://brasilecola.uol.com.br/brasil/mortalidade-infantil-no-brasil.htm>). Diante de tais indicadores podemos considerar que:

- a) Sendo menor a taxa de fecundidade em países desenvolvidos há forte contribuição para que os indicadores de saúde sejam mais favoráveis.
- b) Há fatores culturais e o estilo de vida que de modos diferentes influenciam tais indicadores de saúde.
- c) A expectativa de vida nesses lugares será diferente se considerarmos como forte influência: desenvolvimento social e saneamento básico.
- d) Existe íntima relação entre a taxa de mortalidade neonatal nas duas realidades que deveriam ser consideradas nessa avaliação.

• Questão 04 •

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem (PE) são aplicados para que a oferta e realização dos cuidados de enfermagem sejam feitas com fundamentação teórica e técnica-científica e, por conseguinte, com qualidade. Sobre a SAE e o PE, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir.

- I. Na etapa do diagnóstico de enfermagem faz-se a interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do PE.
- II. A aplicação do processo de enfermagem como instrumento metodológico está prevista no capítulo que trata dos direitos dos profissionais no Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- III. A etapa de coleta de dados e a do diagnóstico de enfermagem podem ser feitas pelo técnico de enfermagem, desde que seja treinado para tal, mas a prescrição de enfermagem é privativa da(o) enfermeira(o).

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- a) V - F - V. b) V - V - F. c) F - V - F. d) V - F - F.

• Questão 05 •

O profissional de enfermagem deve utilizar conhecimentos, atitudes e habilidades que permitem o desempenho eficiente do exercício da profissão. Portanto, esse profissional deve apropriar-se dos instrumentos básicos de enfermagem, os quais são indispensáveis para o desenvolvimento das ações na prática clínica. Nesse contexto, os mais utilizados são:

- a) Conhecimento tecnológico, empreendedorismo, trabalho em equipe e destreza manual.
- b) Aparelhamento tecnológico, padronização de materiais, treinamento em equipe, realização de entrevistas e protocolos.
- c) Esfigmomanômetro, termômetro para temperatura corporal, estetoscópio, caneta e relógio de pulso.
- d) Observação, resolução dos problemas, aplicação dos princípios científicos, planejamento e avaliação.

• Questão 06 •

A educação em saúde considera que toda ação em saúde é uma ação educativa, pois:

- a) Traduz normas de conduta que devem ser seguidas pela população.
- b) Aborda práticas de caráter curativo e preventivo.
- c) Vincula-se a ação assistencial na medida em que as relações estabelecidas com o usuário interferem em seus modos de pensar, sentir e agir.
- d) A saúde é um direito universal, portanto incorpora ações de educação em saúde.

• Questão 07 •

A verificação da Pressão Arterial exige:

- a) Manguito adaptado no braço esquerdo sempre com a largura em torno dos 14 cm, no caso dos adultos.
- b) Determinar como pressão sistólica o primeiro som audível e mais alto quando se utiliza o método auscultatório
- c) Palpação da artéria radial, identificar o ponto em que as pulsações cessam, determinando assim o valor da provável pressão sistólica.
- d) Considerar como pressão diastólica o valor correspondente ao som da última fase de Korotkoff.

• Questão 08 •

A insulina é um hormônio que tem a finalidade de reduzir o nível de glicose no sangue promovendo o aumento do transporte da glicose nos músculos e nas células. Existem vários tipos de insulina, as diferenças estão em sua origem e tempo de ação. Podemos afirmar que a Insulina Rápida:

- É caracterizada por absorção lenta. Administrada por via subcutânea, não é indicada em situações de emergência, nem no tratamento inicial da cetoacidose. Pico de ação entre 8 e 12 horas.
- Pode ser administrada por via subcutânea, endovenosa ou intramuscular, próximo às refeições. É indicada nos casos de cetoacidose diabética, principalmente nas administrações por via endovenosa e intramuscular. Pico de ação em 1 hora.
- Pode ser administrada por via subcutânea, endovenosa ou intramuscular. É indicada nos casos de diabetes descompensada associada a situações de infecção, choque e trauma cirúrgico e cetoacidose. Pico de ação entre 2 e 4 horas.
- Tem seu início de ação muito lento, podendo provocar hiperglicemia no período da manhã. Indicada para ser administrada em dose única diária, não sendo aconselhável dividir a dose. Não há pico de ação, pois sua liberação é praticamente contínua e com efeito prolongado.

• Questão 09 •

O consumo de cigarros por pessoas com diabetes influencia negativamente o controle dessa doença e contribui para o estabelecimento de complicações, embora os mecanismos envolvidos nesses processos ainda não tenham sido completamente esclarecidos (SBD, 2019-2020). Assinale a alternativa correta em relação as afirmações:

- O tabaco associado ao DM tem maior risco para desenvolvimento de neuropatia periférica, pé diabético e insuficiência renal.
 - A suspensão do tabaco pode resultar na melhora do perfil lipídico, com elevação do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e redução do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c).
 - Os dados populacionais não comprovaram que o abandono ao tabagismo houve perdas ponderais significativas.
 - Intervenções motivacionais e cognitivo-comportamentais, isoladamente ou associadas a farmacoterapia, elevam significativamente as chances de abandono do tabagismo em acompanhamentos de médio prazo.
- As afirmações I, II e IV são verdadeiras e III é falsa.
 - As afirmações I e IV são verdadeiras e II e III são falsas.
 - As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
 - As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

• Questão 10 •

O paciente diabético depende de insulina e com o passar dos anos, pode apresentar complicações próprias da doença, dentre elas a neuropatia periférica. Nesse contexto, o cuidado com os pés deve ser intensificado e valorizado pelos profissionais da saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

- I. A neuropatia diabética é de fácil controle, principalmente se o portador fizer uso regular de insulina.
- II. Cuidados diários com os pés são determinantes para diagnóstico precoce de lesões para tratamento.
- III. É indicado o uso de pomadas para ajudar no tratamento de calosidades, feridas e lesões nos pés de diabéticos.
- IV. Cortar as unhas de maneira regular deve ser uma das orientações oferecidas aos diabéticos pela equipe de enfermagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

• Questão 11 •

Em pessoas mais jovens, a PA é determinada em grande parte pela Resistência Vascular Periférica (RVP), enquanto nos idosos se mostra determinada pela rigidez dos grandes vasos arteriais centrais. A HA aumenta progressivamente com o envelhecimento, sendo considerada o principal fator de risco cardiovascular modificável na população geriátrica. Vários fatores explicam essa prevalência.

- I. A hipertensão do avental branco é mais comum em idosos, especialmente em mulheres.
- II. O espessamento da parede arterial e a disfunção endotelial são acompanhadas de aumento na rigidez e redução na complacência vascular.
- III. Maior frequência de hiato auscultatório - após a ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos.
- IV. Pseudo-hipertensão detectada pela manobra de Osler (permanência de artéria radial palpável após a insuflação do manguito acima da pressão sistólica).
- V. Menor resposta dos barorreceptores e, por isso, são mais propensos a hipotensão ortostática (redução igual ou superior a 20 mmHg na PAS, ou diminuição igual ou maior a 10 mmHg na PAD, ou diminuição de qualquer valor seguida de sintomas clínicos) e Hipotensão Pós-Prandial. (HPP).

Assim pode-se afirmar que

- a) estão corretas as afirmações I, II e IV.
- b) estão corretas as afirmações II, III e IV.
- c) estão corretas as afirmações I, III e V.
- d) estão corretas todas as afirmações.

• Questão 12 •

Em relação as ações do Enfermeiro no atendimento ao paciente hipertenso assinale verdadeiro (V) ou falso (F), e seguida assinale a alternativa correta.

- () A consulta de enfermagem deve focar nos fatores de risco modificáveis.
- () As estratégias devem ser planejadas para promover e avaliar a adesão dos pacientes às condutas prescritas com técnicas educacionais, motivacionais, cognitivas e uso das tecnologias.
- () As visitas domiciliares devem ser direcionadas para o encorajamento ao autocuidado e incentivo ao usuário a criar rotinas e hábitos para a tomada da medicação.
- () O enfermeiro deve encaminhar para atendimento médico os usuários inscritos no Programa para a dispensação de medicamentos.

- a) V - V - F - F. b) V - F - V - F. c) F - V - F - V. d) V - V - V - F.

• Questão 13 •

Dois fármacos amplamente utilizados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica são o captopril e a hidroclorotiazida. Sobre os efeitos adversos desses fármacos podemos esperar:

- a) O primeiro pode causar tosse produtiva e alteração de paladar; o segundo pequeno aumento da frequência as micções, hiperpotassemia e hipoglicemia.
- b) O primeiro pode causar tosse seca e alteração de paladar; o segundo grande aumento da frequência as micções, hipopotassemia e intolerância a glicose.
- c) O primeiro pode causar tosse seca e alteração de paladar; o segundo pequeno aumento da frequência as micções, hipopotassemia e intolerância a glicose.
- d) O primeiro pode causar tosse produtiva e alteração de paladar; o segundo grande aumento da frequência as micções, hiperpotassemia e hipoglicemia.

• Questão 14 •

O processo de envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade que se estima para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. O envelhecimento pode ser compreendido como:

- a) Um processo natural de surgimento de patologias agudas, perda de capacidade cognitiva e funcional.
- b) Um processo patológico agudo e irreversível, associado a redução da capacidade funcional e demência senil.
- c) Um processo patológico, diretamente relacionado ao estilo de vida e sedentarismo.
- d) Um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema.

• Questão 15 •

A sarcopenia contribui para as seguintes alterações presentes no idoso:

- a) Redução na força muscular, na mobilidade, no equilíbrio e na tolerância ao exercício, predispondo a quedas e imobilidade.
- b) Alteração no metabolismo basal com consequência da anorexia e da redução da ingestão alimentar e deficiência de vitamina D, magnésio, cálcio e zinco.
- c) Diminuição da sensibilidade à insulina com consequente intolerância à glicose.
- d) Comprometimento da resposta imunológica com a involução anatômica e funcional do timo e redução de 20% a 30% dos linfócitos T.

• Questão 16 •

Na pessoa idosa a progressiva deposição de cálcio, maior deposição de colágeno e menores quantidades de elastina nas camadas das artérias contribuem para menor distensibilidade e maior rigidez das artérias e em consequência aumento da resistência vascular periférica, levando a hipertensão arterial. Em relação a isso considere a alternativa **errada**:

- a) A manobra de Osler é utilizada para a detecção da pseudo-hipertensão em pessoas com processo aterosclerótico.
- b) A presença da hipotensão ortostática em pessoas com hipertensão arterial em tratamento.
- c) A manobra de Osler é considerada positiva quando a artéria radial permanece palpável mesmo após a insuflação do manguito.
- d) A detecção da pseudo-hipertensão é caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado.

• Questão 17 •

Para que ocorra cicatrização é preciso observar a viabilidade do tecido, a presença de infecção ou inflamação, a umidade e a epitelização. Assim, está correto o que se afirma em:

- I. O leito da ferida ressecado ocasiona uma migração lenta das células epiteliais e o excesso de exsudato provoca maceração da margem e da pele perilesional.
- II. Para a epitelização é necessário a migração de queratinócitos, formação da matriz extracelular e neovascularização.
- III. Para que ocorra o processo de cicatrização por completo faz-se necessário o uso de terapias corretivas, que poderá ser desbridamento do tecido morto, enxerto de pele no local, uso de agentes biológicos e terapias adjuntas.
- IV. Na presença de infecção ou inflamação o tecido apresenta-se com número elevado de citocinas inflamatórias, atividade das proteases e baixa atividade dos fatores de crescimento prejudicando a cicatrização.

- a) I, II, IV.
- b) I, II, III.
- c) II, III, IV.
- d) I, III, IV.

• Questão 18 •

A indicação de SF 0,9% morno na ferida é:

- a) Realização de analgesia prévia.
- b) Remoção de agentes inflamatórios do leito da ferida.
- c) Auxilia na minimização da dor.
- d) Manter a umidade do leito da ferida.

• Questão 19 •

No Brasil, utiliza-se o rastreamento pela tosse e define-se a busca ativa de Sintomático Respiratório (SR) como a atividade de saúde pública orientada a identificar pessoas com tosse persistente. Na população geral é considerado SR:

- a) Febre e tosse há pelo menos cinco dias.
- b) Tosse acompanhada de expectoração amarelada há pelo menos três dias.
- c) Tosse por tempo igual ou superior a três semanas.
- d) Febre superior a 38 °C, dor no tórax e tosse seca por tempo igual ou superior a sete dias.

• Questão 20 •

Rede de frio é o sistema de conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Engloba o armazenamento, transporte e a manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração. Em relação aos cuidados que devem ser adotados com a câmara refrigerada na sala de vacinação, é correto afirmar que:

- a) A manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas devem ser mantidas entre +2 °C e +8 °C, sendo a temperatura de controle ideal a +5 °C.
- b) Nas unidades de saúde com pouca demanda de vacinas, a câmara refrigerada pode ser substituída por refrigerador de uso doméstico desde que mantenha a refrigeração ideal entre +2 °C e +7 °C.
- c) A leitura da temperatura deve ser feita no início do turno de trabalho, pela manhã. A temperatura é lida e registrada em formulário, fixado na porta ou na face lateral da câmara refrigerada.
- d) Deve-se limpar o refrigerador, se este for do tipo doméstico, quinzenalmente ou toda vez que este apresentar falha na temperatura máxima, uma vez que pode levar os imunobiológicos a ficarem sob suspeita devido ao alto calor local.

• Questão 21 •

No Brasil, o sarampo é uma doença imunoprevenível para a qual o Ministério da Saúde oferece vacinas para crianças e adultos. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, o programa de vacinação de crianças de 12 meses até menores de 5 anos de idade é:

- a) Uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tetra viral aos 5 anos de idade.
- b) Uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tetra viral aos 15 meses de idade.
- c) Duas doses da vacina tríplice viral, com dois meses de intervalo entre as doses.
- d) Duas doses da vacina tetra viral, com dois meses de intervalo entre as doses.

• Questão 22 •

Ao examinar uma criança de 6 meses, o Enfermeiro constatou, entre outras observações, a presença de *tiragem subcostal*. Este é um sinal respiratório importante e ocorre quando:

- a) A parede torácica inferior se retrai quando a criança inspira.
- b) Toda a parede torácica (superior e inferior) e o abdome se movem para fora quando a criança inspira.
- c) Apenas a musculatura intercostal se move para dentro quando a criança respira.
- d) A parede torácica superior se retrai quando a criança expira.

• Questão 23 •

... toda criança tem direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar. Leia as afirmações, abaixo, e assinale aquela que você considerar **Falsa**, de acordo com os dispositivos do COFEN:

- a) Compete à Equipe de Enfermagem que atua na área pediátrica, a utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico, na assistência à criança e família hospitalizadas.
- b) A utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico pode ser realizada pelo Auxiliar ou Técnico de Enfermagem sem qualquer supervisão.
- c) A prescrição e supervisão do brinquedo terapêutico deverá ser da competência da (o) enfermeira (o).
- d) A utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico deverá contemplar as etapas do Processo de Enfermagem com seu devido registro em prontuário, enquanto documento legal, de forma clara, legível, concisa, datado e assinado pelo autor das ações.

• Questão 24 •

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que provoca a hiper-responsividade dessas vias aéreas, edema de mucosa e produção de muco. Sobre asma, leia as afirmativas abaixo.

- I. A alergia é um fator predisponente de pequena importância para a asma.
- II. Os três sintomas mais comuns da asma são: tosse, dispneia e sibilância.
- III. A asma pode começar subitamente, porém normalmente é precedida de sintomas crescentes.
- IV. A asma só é revertida de forma espontânea.
- V. A inflamação difusa e reversível da via aérea causa edema da membrana que reveste as vias aéreas; contração da musculatura lisa brônquica, gerando irritabilidade adicional e produção aumentada de muco.
- VI. A exacerbação da asma é mais bem controlada por meio do tratamento precoce e da educação do paciente. Os medicamentos de ação rápida, como beta-adrenérgicos, são os primeiros utilizados para alívio imediato da desobstrução do fluxo aéreo.

Somente está correto o que se afirma em:

- a) I, II, III e V somente. b) I, III, IV e V somente. c) II, III, V e VI somente. d) II, IV e VI somente.
-

• Questão 25 •

A orientação é essencial antes de escolher um método anticoncepcional. No processo de escolha deve ser considerados:

- I. O método que a pessoa está pensando ou considerando como preferencial.
- II. Informações sobre a eficácia de cada método e seus efeitos secundários, considerando o seu custo.
- III. Qualquer método deve ser estimulado desde que bem orientado.
- IV. A prática da dupla proteção deve ser estimulada.
- V. Métodos anticoncepcionais reversíveis e que, uma vez interrompido seu uso, haja recuperação total da fertilidade.

São verdadeiras as afirmativas:

- a) I, II e IV. b) I, III e V. c) II, IV e V. d) II, III e IV.
-

• Questão 26 •

A gravidez indesejada é um dos temas destacados na saúde do Brasil por sua alta ocorrência, apesar da existência de uma variedade de métodos anticoncepcionais. Sobre esses métodos e seu funcionamento, é correto afirmar:

- a) A injeção anticoncepcional contém em sua fórmula progesterona combinada ou não com estrogênio e possui como mecanismo de ação a diminuição do período de viabilidade dos óvulos após a ovulação.
- b) Alguns antibióticos podem afetar a ação das pílulas anticoncepcionais pelas interações medicamentosas que se dão entre eles e os contraceptivos orais.
- c) O anel vaginal é um pequeno anel flexível que contém hormônios, devendo ser colocado imediatamente antes da relação sexual e retirado após 12 horas.
- d) O Dispositivo Intrauterino (DIU) e o Sistema Intrauterino (SIU – também conhecido como DIU hormonal) são dispositivos inseridos por profissionais de saúde dentro do útero, impedindo a ovulação.

• Questão 27 •

A atenção à saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde é garantida por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). As linhas de cuidado prioritárias são:

- I. Atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada baseada em evidências científicas.
- II. Promoção da saúde sexual e reprodutiva de mulheres, após a adolescência até o climatério.
- III. Atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

• Questão 28 •

A mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de saúde de uma população. Para isso é utilizado o índice Razões de Mortalidade Materna (RMM), que quando elevado indica:

- I. Condição socioeconômica precária.
- II. Nível de escolaridade baixo.
- III. Dificuldade de acesso aos serviços.
- IV. Presença de violência doméstica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Somente a alternativa I.
- b) Somente as alternativas I e III.
- c) Somente as alternativas II e IV.
- d) Todas estão corretas.

• Questão 29 •

Em 24 de junho de 2011 foi instituída a Portaria nº 1.459/GM/MS, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha. Ela é uma estratégia que visa garantir um atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres. Sobre essa estratégia, analise as afirmativas e assinale a resposta correta:

- () A gestante deverá ser vinculada à maternidade para realização do pré-natal, parto e pós-parto imediato;
- () Um dos objetivos da Rede Cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil;
- () Uma diretriz da Rede Cegonha é garantir o acesso às ações do planejamento reprodutivo.

- a) F – V – V.
- b) V - V – V.
- c) F - V – F.
- d) V - F – V.

• Questão 30 •

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. Dentre as recomendações do Ministério da Saúde exame citopatológico do colo do útero, segundo o caderno da atenção básica “Controle dos cânceres do colo do útero e da mama” (BRASIL, 2016) é **CORRETO** afirmar:

- a) O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- b) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, independente da atividade sexual.
- c) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos após essa idade.
- d) Mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, podem ser dispensadas.

Fontes: Brasil. Ministério da Saúde. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres** / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 230 p.

Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. – 2. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016. 114 p.

• Questão 31 •

A referência utilizada para esta questão é a mais atualizada do Ministério da Saúde sobre o tema. Manteremos da forma original.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 318 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n° 32).

O Caderno de Atenção Básica “Atenção ao pré-natal de baixo risco” (BRASIL, 2012), descreve o cálculo da Data Provável do Parto (DPP) pela Regra de Nägele. Assim, a DPP da mulher cuja Data da Última Menstruação (DUM) foi 27 de agosto de 2023 será:

- a) 03 de maio de 2024.
- b) 27 de maio de 2024.
- c) 03 de junho de 2024.
- d) 06 de junho de 2024.

• Questão 32 •

A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada por um protozoário flagelado unicelular, cujo período de incubação é em média, de 10 a 30 dias. Sobre esta doença, é **correto** afirmar:

- a) Somente a mulher contrai tricomoníase, sendo esta, a principal causa de vulvovaginites.
- b) O tratamento para tricomoníase da mulher é por via intravaginal.
- c) No caso das gestantes, devem ser tratadas já no primeiro semestre de gestação.
- d) O aparecimento de pápulas eritemato-acastanhadas nas mãos é comum no início da infecção.

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

• Questão 33 •

Sobre a candidíase vulvovaginal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() É uma infecção causada por um fungo cuja principal forma de transmissão é sexual e que infecta a vagina e a uretra.

() A gestação predispõe o aparecimento de candidíase vaginal e dentre os sintomas estão: prurido, corrimento branco, grumoso e inodoro e dispareunia.

() O tratamento da candidíase vulvovaginal deve ser realizado preferencialmente com medicação por via oral, sendo indicado fluconazol 150 mg em dose única.

() Este microrganismo pode fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres.

- a) V - V - F - F. b) F - V - F - V. c) V - F - V - F. d) F - F - V - V.

• Questão 34 •

Com as modificações circulatórias no pós-parto, os estímulos ao movimento devem ser favorecidos e os membros inferiores devem ser avaliados diariamente. Como enfermeiro você precisa ficar atento à:

- a) Redução de edemas com massagens em membros inferiores.
b) Manutenção da mulher em repouso o maior tempo possível.
c) Presença de edemas, dor e hiperemia local.
d) Presença de hematomas, edema e calor local.

• Questão 35 •

O puerpério se inicia imediatamente após o parto e dura, em média seis semanas após este, havendo variabilidade na duração entre as mulheres. Conforme **preconizado pelo Ministério da Saúde**, esse período é dividido para facilitar a organização das ações de saúde. Assinale a alternativa **correta**:

- a) Abrange as quatro fases do puerpério: imediato (até 24 horas do pós-parto), precoce (do 2º ao 7º dia e tardio (do 8º ao 42º dia).
b) Prevê a realização de uma revisão global das condições da puérpera e do recém-nascido entre sete e dez dias, e outra avaliação até 42 dias de pós-parto.
c) O puerpério imediato ocorre entre o 1º e 10º dia após o parto, o tardio entre o 11º e 45º dia e o remoto após o 45º dia e não tem previsão de término.
d) O pós-parto imediato corresponde as primeiras duas horas após o parto e o puerpério mediato ao período até o 10º dia.

• Questão 36 •

Uma pessoa idosa, magra e de baixa estatura é conduzida ao serviço de emergência. Seu acompanhante informa que a paciente está se “engasgando” e acha que ela aspirou algum objeto. Observa-se que a idosa está com as mãos sobre o pescoço, inquieta, ofegante, respiração irregular, com tosse e cianose. Qual é a manobra de emergência que deve ser aplicada nesse caso?

- a) Valsalva.
b) Heimlich.
c) Giordano.
d) Oslander.

• Questão 37 •

A atenção à pessoa idosa implica na construção de um novo paradigma das práticas de saúde, na medida em que demanda a ampliação do olhar em relação ao modelo biomédico focado na doença e na cura. Identifique particularidades do Cuidado à Pessoa idosa analisando as afirmativas a seguir.

- I. Capacidade funcional orientando o cuidado.
- II. Qualidade de vida relacionada à capacidade funcional, ações de manutenção da autonomia e independência.
- III. Heterogeneidade dos processos de envelhecimento, fatores socioeconômicos, acesso aos serviços públicos, hábitos de vida e aspectos culturais.
- IV. Menor vulnerabilidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV. b) I, II e III apenas. c) I, II e IV apenas. d) II, III e IV apenas.

• Questão 38 •

Paciente idoso, 65 anos, admitido em serviço de emergência com queixa súbita de fraqueza muscular de um lado do corpo, confusão mental e disfasia há cerca de 2 horas, foi avaliado pelo médico e encaminhado para tomografia de crânio, com resultado compatível de Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi), sendo indicado ao tratamento trombolítico intravenoso. Dentre os cuidados apresentados, qual conduta é **contraindicada** para esse paciente?

- a) Suplementar O₂ para manter saturação de oxigênio maior ou igual 95%.
- b) Realizar sonda vesical de demora nos primeiros 30 minutos para controle do débito urinário.
- c) Monitoramento cardiovascular e pressórico não invasivo contínuo, pelo menos nas primeiras 24 horas.
- d) Realizar medidas para evitar hipertermia.

• Questão 39 •

Por que a eficiência nos estudos, a pesquisa em bases de dados e a interpretação de textos acadêmicos é importante para os estudantes em um curso de enfermagem?

- a) Porque eles precisam apenas cumprir tarefas acadêmicas para obter um diploma.
- b) Porque ajuda no desenvolvimento de habilidades essenciais para uma prática de enfermagem baseada em evidências e segura.
- c) Porque isso permite que eles tenham mais tempo para atividades sociais fora da universidade.
- d) Porque os professores valorizam mais a quantidade de trabalho do que a qualidade.

• Questão 40 •

Considera-se essência na avaliação do pulso periférico e o apical a obtenção da frequência, volume e ritmo. Preferencialmente deve-se optar pela manutenção do paciente na posição deitada e após um intervalo de repouso.

- a) A primeira alternativa está correta, mas a segunda está incompleta nos cuidados com o posicionamento.
- b) A primeira afirmativa não contemplou todas as características enquanto a segunda está incorreta quanto a prioridade apontada.
- c) A primeira e a segunda afirmativas estão incorretas pois apontaram características essenciais apenas para o pulso radial.
- d) Ambas as afirmações estão corretas, porém incompletas.



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



PUC-SP



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

NucVest
vestibulares e concursos

www.nucvest.com.br